

Vacuna neumocócica conjugada (VCN)

 **Previene:** Neumonía, enfermedad invasiva e infecciones producidas por *S. Pneumoniae* (neumococo).

 **Hay 3 vacunas disponibles:**

Vacuna neumocócica 13 valente (VCN 13):

Contra los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F de neumococo.

Vacuna neumocócica 15 valente (VCN 15):

Contra los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F de neumococo.

Vacuna neumocócica 20 valente (VCN 20):

Contra los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F de neumococo.

 **Indicaciones:**

Vacuna neumocócica 13 valente: En calendario nacional se indica:

- A los niños de 2, 4 y 12 meses.
- Mayores de 65 años 1 dosis y luego 1 refuerzo con vacuna neumocócica polisacárida (VPN).
- Personas de 5 a 64 años con comorbilidades deberán recibir 1 dosis y luego completar el esquema con vacuna neumocócica polisacárida (VPN) dependiendo de la patología de base.

Vacuna neumocócica 15 y 20 valente: No son las elegidas en calendario nacional de vacunación aunque tienen las mismas indicaciones que VCN 13. Se indican:

- Niños menores de 2 años: 2 o 3 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas, y 1 dosis de refuerzo entre los 11 y 15 meses de edad.
- Niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos: 1 dosis

 **Efectos adversos post-vacunación:** Puede presentar fiebre, reacción local (dolor, eritema y tumefacción), irritabilidad, somnolencia, vómitos y diarrea.

La información aquí brindada no invalida la opinión de su médico.
Ante cualquier duda comuníquese con él o con nuestro Staff Científico.
www.previvax.com.ar / cientifico@previvax.com.ar



PREVIVAX