

Vacuna triple viral

- 🔹 **Previene:** Sarampión, rubéola y paperas.
Enfermedades transmitidas por vía respiratoria.
- 🔹 **Esquema:** En calendario nacional de vacunación:
 - 2 dosis a los 12 meses y al ingreso escolar (5 a 6 años).
 - 2 dosis a adultos sin vacunación previa con intervalo mínimo de 1 mes.
- 🔹 **Indicaciones:** A partir de los 12 meses de edad.
Niños de 11 años de edad y adultos sin antecedentes de enfermedad o vacunación.
- 🔹 **Recomendación:** Si va a aplicar esta vacuna junto con vacuna varicela, dengue y/o fiebre amarilla se deben aplicar en el mismo día o separadas de 4 semanas entre sí.
- 🔹 **Efectos adversos post-vacunación:** Reacción local (dolor, eritema y tumefacción). Puede presentar fiebre, catarro y erupciones entre 5 a 35 días post-vacunación.
Ante la duda debe consultar al médico.
- 🔹 **Contraindicaciones:** Inmunosuprimidos, mujeres embarazadas y en período de lactancia.

*La información aquí brindada no invalida la opinión de su médico.
Ante cualquier duda comuníquese con él o con nuestro Staff Científico.
www.previvax.com.ar / cientifico@previvax.com.ar*

