

## Vacuna fiebre amarilla

- Previene:** Fiebre amarilla. Enfermedad transmitida por la picadura de mosquito infectado.
- Esquema en zonas de riesgo:**  
2 dosis: 18 meses de edad y refuerzo a los 11 años de edad.  
En viajeros por requisito del Reglamento Sanitario Internacional: 1 dosis.
- Indicaciones:**
  - Viajeros que ingresan a áreas de riesgo o a un país con exigencia de vacunación, 1 dosis de por vida.
  - En calendario nacional de vacunación para residentes argentinos en zonas de riesgo como las provincias de Misiones, Formosa, algunos departamentos de Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy, 2 dosis a los 18 meses de vida y un refuerzo a los 11 años.
- Recomendación:** Si va a aplicar esta vacuna junto con vacuna varicela, triple viral y/o dengue se deben aplicar en el mismo día o separadas de 4 semanas entre sí.
- Efectos adversos post-vacunación:** Es poco frecuente el dolor de cabeza, muscular, reacción local (dolor, eritema y tumefacción) y fiebre entre el 3er. y 7mo. día posterior a la aplicación. Las reacciones graves son de muy baja frecuencia. Se observa enfermedad neurotrópica en menores de 6 meses de edad, y enfermedad viscerotrópica en mayores de 60 años.
- Contraindicaciones:** Inmunosuprimidos, mujeres embarazadas y en período de lactancia.

*La información aquí brindada no invalida la opinión de su médico.  
Ante cualquier duda comuníquese con él o con nuestro Staff Científico.  
[www.previvax.com.ar](http://www.previvax.com.ar) | [cientifico@previvax.com.ar](mailto:cientifico@previvax.com.ar)*

